

Interferón a-2 pegilado



Marca comercial: Pegasys (2a), PEG-Intron (2b)

Clase de medicamento: Infecciones oportunistas y otros

El interferón a-2 pegilado pertenece a dos clases de medicamentos, a saber, antivíricos y modificadores de la respuesta biológica. Los antivíricos destruyen los virus o les impiden multiplicarse. Los modificadores de la respuesta biológica estimulan la respuesta del cuerpo a la infección y a la enfermedad. El interferón a-2a pegilado, conocido también como Pegasys, y el interferón a-2b pegilado, conocido también como Peg-Intron, están autorizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el tratamiento de la hepatitis C crónica, una infección común que se produce simultáneamente en pacientes infectados por el VIH. Suele recetarse junto con ribavirina, otro antivírico.

Formas de empleo para el tratamiento del VIH/SIDA

El interferón a-2 pegilado se usa para tratar la hepatitis C crónica en pacientes infectados simultáneamente por el VIH.

Presentación/Administración

Ambas clases de interferón se administran en inyección subcutánea.

Contraindicaciones

Las personas con cualquier afección previa deben informárselo al médico antes de tomar interferón a pegilado.

Posibles efectos secundarios

Además de sus efectos deseables, el interferón a pegilado puede causar algunos efectos adversos. Los efectos que pueden necesitar atención médica comprenden ansiedad, depresión, alteraciones del estado de ánimo, fiebre, dolor abdominal continuo, diarrea sanguinolenta, infección vírica, dificultad para dormir, irritabilidad, escalofrío, tos o ronquera, lumbago o dolor lateral, dolor o dificultad para orinar, náusea o vómito, deposiciones negras o con apariencia de alquitrán, sangre en la orina o la materia fecal, diminutas manchas rojas en la piel y hemorragia o hematoma poco comunes. Los pacientes deben informar al médico si tienen síntomas de cualquiera de esos efectos secundarios.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo. Entre ellos cabe citar dolor abdominal, alopecia, inapetencia, tos, diarrea, mareo, sequedad de la piel, dispepsia, fatiga, escalofrío, cefalea, dolor en las articulaciones o los músculos, flujo nasal, estornudos o dolor de garganta, crisis vasomotoras, hematoma, irritación o prurito en el sitio de la inyección, malestar, dolor osteomuscular, náusea, dolor, congestión o tensión de la zona sinusal afectada, erupción cutánea o prurito, sudor profuso, vómito y adelgazamiento. Los pacientes deben informar al

médico si esos efectos adversos continúan o son molestos.

Interacción con otros medicamentos y la comida

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos que usan o han usado este medicamento

Para obtener información en español acerca de ensayos clínicos que estudian interferón a-2 pegilado, visite el sitio web de AIDSinfo:

<http://www.aidsinfo.nih.gov/ClinicalTrials> y haga clic en el enlace azul en español al inicio de la página. En la casilla de búsqueda, escriba interferón a-2 pegilado.

Esta búsqueda está limitada a ciertos ensayos clínicos patrocinados por el gobierno y traducidos al español.

Para hacer una búsqueda más completa de ensayos clínicos para el tratamiento del VIH/SIDA, visite el sitio web de [clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov) en

<http://www.clinicaltrials.gov> para utilizar una base de datos de ensayos clínicos en inglés. En la casilla de búsqueda, escriba Peginterferon alfa-2 AND HIV infections.

Fabricantes

Peginterferon alfa-2
Roche Laboratories
340 Kingsland Street
Nutley, NJ 07110
(973) 235-5000

Pegasys (2a)
Roche Laboratories
340 Kingsland Street
Nutley, NJ 07110
(973) 235-5000

Interferón a-2 pegilado



Fabricantes (cont.)

Peginterferon alfa-2
Schering - Plough Corp
2000 Galloping Hill Rd
Kenilworth, NJ 07033-0530
(800) 526-4099

PEG-Intron (2b)
Schering - Plough Corp
2000 Galloping Hill Rd
Kenilworth, NJ 07033-0530
(800) 526-4099

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este